

患者資訊 僅供處方使用  
**BEYFORTUS™ (Bay for tus)**  
**(nirsevimab-alip)**  
**注射劑，用於肌肉注射**

**什麼是 BEYFORTUS？**

BEYFORTUS 為處方藥物，用於幫助以下群體預防因感染呼吸道融合病毒(RSV)而導致的嚴重肺部疾病：

- 正值或進入第一個RSV好發季節時出生的新生兒或未滿1歲的嬰兒。
- 在第二個RSV好發季節仍有高風險罹患嚴重RSV疾病的24個月以下兒童。

BEYFORTUS是一種含有nirsevimab-alip的抗體，用於幫助預防RSV疾病，保護力持續時間為5個月。

BEYFORTUS對24個月以上兒童的安全性和有效性仍不清楚。

**若您的孩子對nirsevimab-alip或BEYFORTUS的任何成分有嚴重的過敏反應史，請勿接種BEYFORTUS。**欲瞭解BEYFORTUS完整成分清單，請參見本患者資訊頁末。

**在您的孩子接種BEYFORTUS之前，請將孩子的所有醫療狀況告知您的醫療保健人員，包括如果孩子：**

- 曾對BEYFORTUS出現反應。
- 曾發生出血或瘀青問題。若您的孩子有容易出血或瘀青的問題，可能因注射導致傷害。

**請告知醫療保健人員關於孩子的所有用藥情況**，包括處方和非處方藥物，維他命以及草本保健品。如果嬰兒在同一個RSV好發季節已經接種BEYFORTUS，請勿再使用Palivizumab藥物。

**BEYFORTUS 如何給藥？**

- BEYFORTUS是一種注射劑，通常由醫療保健人員注射於大腿肌肉。
- **您的孩子應該在RSV好發季節之前或期間接受BEYFORTUS。**RSV季節是一年中RSV感染最普遍的時期，通常發生在秋季至春季。您可以詢問醫療保健人員您所在地區何時開始進入RSV好發季節。
- **您的孩子在注射BEYFORTUS後仍有可能感染RSV疾病。**請和孩子的醫療保健人員討論該注意哪些可能出現的症狀。
- 如果您的孩子接受心臟手術，孩子的醫療保健人員可能需要術後盡快幫孩子注射額外的BEYFORTUS注射劑。

**BEYFORTUS 可能有哪些副作用？**

- 使用BEYFORTUS藥物曾發生過**嚴重的過敏反應。**
- 若您的孩子有以下嚴重過敏反應的徵兆或症狀，請立即尋求醫療協助：
  - 臉部、口腔或舌頭腫脹
  - 皮膚、嘴唇或指甲內的顏色呈藍色
  - 吞嚥或呼吸困難
  - 肌肉無力
  - 無意識
  - 嚴重紅疹、蕁麻疹或瘙癢

**BEYFORTU最常見的副作用為紅疹與注射部位疼痛、腫脹或出現硬塊。**但BEYFORTUS仍可能引發其他副作用。關於副作用，請致電醫生尋求醫療建議。您可以透過1-800-FDA-1088向FDA通報副作用。

**關於安全有效使用BEYFORTUS的一般資訊**

藥品有時會被使用於患者資訊手冊中所列之外的醫療用途。您可以向您的藥師或醫療保健人員詢問有關BEYFORTUS的資訊，這些資訊是為醫療專業人員所編寫的。

**BEYFORTUS的成分有哪些？**

**活性成分：**nirsevimab-alip

**非活性成分：**精胺酸鹽酸鹽、組胺酸、L-組胺酸鹽酸鹽、聚山梨醇酯 80、蔗糖和注射用水。

生產商：AstraZeneca AB, Södertälje, Sweden SE-15185

美國執照號：2059

經銷商：Sanofi Pasteur, Inc., Swiftwater, PA 18370 USA。

BEYFORTUS 是 Sanofi 集團公司的商標。

©AstraZeneca 2024

欲瞭解更多資訊，請瀏覽 <https://www.Beyfortus.com/cn>，或致電 1-855-239-3678 (1-855-BEYFORTUS)。

本患者資訊已獲美國食品和藥物管理局核准。

發佈日期：2024年 2月

MAT-US-2402650-v1.0-03/2024